



قیمت سیگار توانسته مهاری برای کاهش استعمال سیگار پاشد بلکه سیگاری‌های کم درآمد را به طرف کشیدن سیگارهای ارزان‌تر که هم ضرر بیشتر دارند و هم دود بیشتر و در اصطلاح سیگاری‌ها به سیگارهای گازوئیلی معروف است ترغیب کند. وقتی به آسانی با ارائه جریمه‌ای متوسط فرهنگ استفاده از کمریند اینمی‌حتی در معابر داخل شهری به راننده‌گان القا شد چگونه از این اهرم برای منع استعمال دخانیات در معابر عمومی استفاده نشده است؟

شیوه‌های ترک سیگار

هم‌اکنون در کشور ما در بسیاری از شهرها کلینیک ترک دخانیات دایر است. داوطلبان ترک سیگار با مراجعته به این مراکز از خدمات مشاوره‌ای رایگان و مراقبت‌های دوره‌ای زیر نظر پزشکان کلینیک استفاده می‌کنند. از سوی دیگر براساس یکی از آخرین مطالعات بیماری و سلامت، ۱۷ درصد از افرادی که به‌این مراکز مراجعه می‌کنند افراد زیر چهل سال تشکیل می‌دهند و دو سوم آنها نیز نخستین سیگار خود را در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال تجربه کرده‌اند.

سیگار فریب می‌دهد

سیگار یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری در همه جوامع است. اغلب افراد سیگاری ادعا می‌کنند سیگار باعث کاهش عصباتی و تنفس و رفع اضطراب و خستگی آنان می‌شود، اما تحقیقات نشان می‌دهند شروع به مصرف دخانیات، جنبه روانی دارد و سیگار تنها به صورت گذرا و موقت، عصباتی را کاهش می‌دهد ولی ساعتی بعد اضطراب و نگرانی شدت بیشتری می‌گیرد.

سیگار میان دانش‌آموزان

شیوع مصرف سیگار در میان نوجوانان روبه افزایش است و متاسفانه هر ساله سن شروع به استعمال دخانیات کاهش می‌یابد. دریک تحقیق از مایشی که در نواحی شهری و روستایی شهرستان‌های اصفهان، نجف‌آباد و اراک میان ۱۹۵۰ دانش‌آموز، ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸ و ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ میان مدارس به صورت تصادفی انعام گرفت، چهار درصد دختران، ۱۲/۹ درصد پسران و در مجموع ۸/۷ درصد از کل دانش‌آموزان گفتند که روزانه دست کم یک نخ سیگار می‌کشند. جالب این جاست که متوسط سن دختران و پسران دانش‌آموز چهارده تا پانزده سال بود.

برخی از مستولان بهداشت کشور هنوز امیووارانه به این معضل نگاه می‌کنند و با بیان این‌که هنوز هم ایران به نسبت کشورهای دیگر آمار استعمال سیگار کمتری دارد، می‌گویند: اجرای برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه می‌تواند آمار فعلی را نیز کاهش دهد و حداقل مانع از گرایش سایر افراد و پیوستن آنان به جامه سیگاری‌ها شود. بدراستی آیا روزی شاهد استعمال آخرین نخ سیگار در میان سیگاری‌ها خواهیم بود؟

سیگاری‌ها در محدوده زمان

شاید این انتقاد مطرح شود که با منع سیگار کشیدن در اماکن عمومی، افراد به خانه‌ها پناه می‌برند و زن و بچه‌هایشان را در معرض آلودگی‌های ناشی از دود دست دوم سیگار قرار می‌دهند اما با یک تحلیل ساده می‌توان گفت: افراد بیش از نیمی از وقت خود را در خانه خواب هستند و مابقی آن را نیز که در کنار زن و فرزند می‌گذرانند به‌علت برخی حساسیت‌ها کمتر به کشیدن سیگار در محیط خانه رغبت نشان می‌دهند و این می‌تواند آغازی برای کمتر سیگار کشیدن و یا ترک مصرف دخانیات باشد.

سیگار کشیدن تحفه غرب و اروپا برای جوانان ایرانی بود و با تقلید از هنرپیشه‌های سینمای غرب رواج یافت. حالا اما به نظر می‌رسد کسانی که به سادگی به خاطر همین تقلیدهای سطحی، سیگاری شده‌اند توانند به همین راحتی با ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی کنار بیایند.

از هر دو نفری که سیگار کشیدن را از دوره جوانی شروع می‌کنند، یک‌نفر به علت عوارض آن، جان خود را از دست می‌دهد. این واقعیت تلخ را تحقیقات کارشناسان ثابت می‌کند. سالانه بیش از پنجاه‌هزار نفر در ایران بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در میان جهانی به روزانه ۲۵ هزار نفر می‌رسد. این آسیبهای بدهیلیل بیش از چهارهزار نوع ماده سمی و خطناک موجود در ترکیبات سیگار است که انواع سلطان‌ها و سکنه‌های قلبی و مغزی از عوارض آن بهشمار می‌آید.

تا چندسال پیش، کشیدن سیگار در کشورهای اروپایی هیچ محدودیتی نداشت، اما از سال ۲۰۰۴ کشور ایرلند کشیدن سیگار را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد و به دنبال آن کشورهای سوئد و ایتالیا نیز قوانینی برای منع استعمال دخانیات وضع کردند. امسروزه در پیش‌تر کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی در این‌باره اعمال می‌شود. در کشور فرانسه کشیدن سیگار در بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات، ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها ممنوع است و متخلفان با جرم‌های نقدی تا سقف ۶۸ یورو رو به رو می‌شوند. در انگلستان این جرم‌ها شدیدتر است و گاه تا ۲۵۰۰ پوند هم می‌رسد.

یک تأمل

این که امریکا و کشورهای اروپایی با وضع این قوانین سخت و ایجاد محدودیت‌های بسیار می‌کوشند مصرف دخانیات را در کشورشان کاهش دهند، اما از آن سو شرکت‌ها و کارخانجات تولید دخانیات آن‌ها هرچه بیش تر محصولات خود را به کشورهای جهان سوم سرآزیر کرده و در تبلیغ کالاهایشان هم از هیچ‌چیز کوتاهی نمی‌کنند، سوالی است که باید جوانان و نوجوانان عزیز کشور ما درباره آن تأمل کنند.

دود دست دوم

براساس یافته‌های محققان، دود سیگار دست دوم شامل بیش از پنجاه نوع ماده سلطان‌زا و حدائق ۲۵۰ ماده شیمیایی خطناک است و در این میان بیشترین خطرها متوجه کودکان و نوجوانانی است که با والدین سیگاری خود زندگی می‌کنند. در همین حال گفته شده احتمال ابتلاء به سلطان ریه در افراد غیرسیگاری که با افراد سیگاری زندگی می‌کنند سی درصد بیشتر از دیگران است و در بزرگسالان به بروز بیماری‌های قلبی و سلطان ریه و در کودکان به ستدرم مرگ زودرس و بیماری‌های ریوی منجر می‌شود. مصرف دخانیات در حالی سالیانه جان پنج میلیون نفر را در جهان می‌گیرد که با وضع برخی قوانین می‌توان درصد بالایی از اثرات آن را کنترل کرد. متأسفانه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده آمار تلفات مرگ و میرهای ناشی از مصرف سیگار تا سال ۲۰۲۰ روزانه به ۲۵ هزار نفر می‌رسد.

حمید خانی

پُکِ آخر

آیا افزایش قیمت سیگار راه حل مناسبی است؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش